



(GT)

serum, plasma, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

· pg/mL

· - pg/mL





GT GT

-HRP

TMB TMB

GT n



•	C	g	-	-
•	- C	g	-	-
•	EDTA-Na		-	-
•	P			



μL

μL

 μL

μL

μL

 μL

μL


 μL

μL

μL

μL


μL





.
 .
 .

. mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL
 pg/mL



. (x)
 (μL)
 . - . mL μL
 μL
 . - (x)
 (μL)
 . - .
 mL μL μL

. TMB





1. 将待测样品加入反应孔中，每孔加入 100 μL。
2. 加入 100 μL 的 TMB 底物溶液，轻轻混匀。
3. 加入 100 μL 的 HRP 酶液，轻轻混匀。
4. 加入 100 μL 的终止液，轻轻混匀。
5. 将反应孔中的溶液在 450 nm 处测定吸光度 (OD 值)。
6. * 计算结果。



.

.

OD

OD

OD

X


Y

OD

OD

curve expert

	.
	.
	.
	.
.	.
.	.
.	.
.	.





●

CV

CV

●

(n)	-	
EDTA (n)	-	
heparin (n)	-	

●

	:	:	:	:
(n)	-	-	-	-
EDTA (n)	-	-	-	-
heparin (n)	-	-	-	-











-
-
-
-
-
-
-
-
-

ELK Biotechnology

027-59760950

elkbio@elkbiotech.cn

