

(LDH)

号

: ,

2, 可乳

剂 个 48T 96T

保可

冲

促剂

剂 剂 使 前 先 剂 中 加 分 冷冻 以 反 冻 后

冷冻可保 再取 后

使 例加 冷冻 后即可使

:促剂剂 可

入 反 冰 下 功 取 上 其
剂 分 分 上
准 取 体 例 加入 倍体
冰 件下 匀 分 分 取上 上
其 先 剂 公司 分 分
入 中 取 净 再 吸 吸 后剪
例 加入 倍体 、 取 仪
分 分 分 取上 净 冰 分后
下 匀 体 分 例 加入 倍体 件

()

		准		
丙	准			
剂一				
剂二				
匀 分				
剂三				
匀 分				
剂				
匀 分 仪				值。

* 上 仅供参 以具体 值为准 人 一 倍 后 以

C : 准
Cpr: 。

3

1 取 倍 人 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为 。

2 取 倍 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为 。

3 取 匀 乳 力 吸光 为
吸光 为 准 吸光 为 准 吸光 为
匀 为 即 。

、 于加 ① 加 住加 ② 吸
加 加 吸 上 以保 吸 上 ③
可 分 以保 及 剂 以减 。

、 以 匀力 中 使 动 匀 动作不 剧
以免 体 出 则 匀不充分 先 上 体 动 下 再前后、
右 动。

、 可 初 吸光 使 前先 其初 吸
光 下 后再加 。

、 加 免产 。

、 剂 仅 于 。


、 可 低于 可先 中反 再吸取
加入到 中 。

1

丙 准 分别 倍、 倍、 倍、 倍、
倍、 倍、 倍后 作 准 作制作 准 。

2

以吸光 为 以 准 为 制 准 。



LDH

1
2
3

。原为则倍
后为以其他

倍		倍	倍	倍	倍	倍
值						

参取
关。

为倍。其内
则后

会出

LDH

1

2

取出后 制 匀 上
倍 后再 分别 不同
 作 作。同 匀 、 、 、 、
 公司 。 于 、 亮 、

3

LDH